

ALKOHOLOVÁ CHOROBA PEČENE

PATRÍCIA MIŠČÍKOVÁ 3. C




OBSAH

1. Pečeň
2. História
3. Závislosť
4. Alkoholová choroba pečene
5. Čo to vlastne je?
6. Cirhóza pečene
7. Faktory zvyšujúce riziko ACHP
8. Liečba ACHP
9. Bezpečná a riziková konzumácia alkoholu
10. Vstrebávanie alkoholu
11. Štádiá intoxikácie
12. Liečba závislosti

PEČEŇ

- najväčší orgán v brušnej dutine
- tvorba glukózy
- stála hodnota energie
- detoxikácia
- syntéza bielkovín
- zásobáreň látok



HISTÓRIA

- neolit
- Vikingovia, Slovania (medovina)
- Japonci (víno z ryže)
- Indiáni (agáve)
- Inkovia (kukurica)
- Babylončania (pivo)
- Arabi – čistý alkohol (destilácia)
- využitie v medicíne



ZÁVISLOST

- najrozšírenejšia
- život ohrozujúca
- polyfaktoriálne príčiny
- tăžko liečiteľná
- rozvinutá spoločnosť
- nárazové pitie



ALKOHOLOVÁ CHOROBA

PEČENE (ACHP)

- **200 rokov**
- **Európa – najvyššia spotreba alkoholu**
- **ACHP – 3. najčastejšia príčina úmrtí**
- **SR a ČR – najvyššia spotreba alkoholu v EÚ**
- **11% obyvateľov závislých (SR)**
- **veková hranica sa znižuje**
- **tragické následky**
- **slávne osobnosti**

ČO TO VLASTNE JE?

- časté a nadmerné pitie alkoholu
- stukovatenie
- zápaly
- pokračuje do cirhózy
- priama súvislost' s úmrtnosťou



CIRHÓZA PEČENE

- konečné štadium ACHP
- difúzny proces
- fibróza
- odumretie pečeňových buniek
- najčastejšia príčina - alkohol
- 6. najčastejší dôvod úmrtia



FAKTORY ZVYŠUJÚCE RIZIKO ACHP

- dlhodobý príjem alkoholu (15-20 rokov)
- ženské pohlavie
- genetické faktory
- pitie mimo jedla (nalačno)
- vysoko koncentrované alkoholické nápoje (destiláty)
- miešanie alkoholických nápojov
- nárazové pitie
- súčasné iné ochorenie pečene



LIEČBA ACHP

- **Abstinencia**
- **Liečba abstinenčného syndrómu**
 - dostatočná hydratácia
- Nutričná podpora
- Vitamíny skupiny B, silymarín
- Glukokortikoidy
- Esenciálne fosfolipidy
- Transplantácia – pri overenej 6-mesačnej abstinencii



BEZPEČNÁ A RIZIKOVÁ KONZUMÁCIA ALKOHOLU

RIZIKO CIRHÓZY:

- muži: viac ako 40 g/deň
- ženy: viac ako 20 g/deň

BEZPEČNÁ DÁVKА ALKOHOLU:

- muži: max. 20 g/deň (2 štandardné poháriky)
- ženy: max. 10 g/deň (1 štandardný pohárik)

ŠTANDARDNÉ POHÁRIKY: 250 ml piva

125 ml vína

25 ml destilátu

Tabuľka 1. Odbúranie alkoholu z krvi.
(Prepočet na zdravú dospelú osobu 70 kg hmotnosti)

0,05 l 10 ° piva 13 g alkoholu 0,28 ‰	Odbúranie z krvi za 2,5 h
0,5 l 12 ° piva 15 g alkoholu 0,35 ‰	Odbúranie z krvi za 3 h
0,2 dl prírodného vína 18 g alkoholu 0,4 ‰	Odbúranie z krvi za 3,5 h
0,05 dl 40 % destilátu 17 g alkoholu 0,4 ‰	Odbúranie z krvi za 3,5 h
0,2 dl dezertného vína („umelého“) 24 g 0,55 ‰	Odbúranie z krvi za 4,5 h
0,1 dl 40 % destilátu 28 g alkoholu 0,6 ‰	Odbúranie z krvi za 5 h

ŠTÁDIÁ INTOXIKÁCIE

1. Excitačné štádium

- 0,5-1 ‰

2. Hypnotické štádium

- 1-2,5 ‰

3. Narkotické štádium

- 2,5-3,5 ‰

4. Asfyktické štádium

- nad 3,5 ‰



LIEČBA ZÁVISLOSTI

- 1. Ambulantná**
 - pacient podstúpi dobrovoľne
- 2. Nemocničná**
 - ak zlyháva ambulantná liečba
 - trvá približne rok
 - kombinácia behaviorálnych postupov, farmakoterapie a psychoterapie



ZDROJE

- <http://zdravie.pravda.sk/zdravie-a-prevencia/clanok/288859-cirhoza-pecene-mnohe-priciny-najcastejsie-alkohol/>
- <http://primar.sme.sk/c/5395999/cirhozu-nemaju-len-alkoholici.html>
- <http://www.celostna-medicina.sk/?choroby-pecene,19>
- <http://www.solen.sk/pdf/cf91ab44620522664040a744968f6277.pdf>
- <http://www.zdravie.sk/choroba/209/cirhoza-pecene>
- <http://www.alkohol.klobuckamafie.cz/html/stanoveni-hladiny.html>
- http://www.ntic.sk/doc/Lekarnik_JK_OH.pdf

ĎAKUJEM ZA POZORNOSŤ

