



**Viem že, malý bojovník je
najväčší bojovník**

Zuzana Giňovská

3.C

Obsah

- Tehotenstvo
- Pôrod
- Faktory ovplyvňujúce graviditu
- Novorodenec
- 17. november
- Diskusia
- Záver

Tehotenstvo (Gravidita)

- Začína splynutím vajíčka a spermie,
- ukončené pôrodom,
- trvá 40 týždňov – 9 kalendárnych, teda 10 lunárnych mesiacov,
- 3 trimestre.



Rizikové tehotenstvo

- Gravidita, v priebehu ktorej nastáva ohrozenie zdravia ženy alebo plodu,
- zaistený rizikový faktor, no tehotenstvo prebieha normálne,
- 30%.



Príčina

- Ochorenie matky pred otehotnením,
- ochorenia, ktoré sa objavia počas gravidity,
 - tehotenská cukrovka,
- krvácanie,
- nedostatočnosť krčka maternice,
- nízko posadená placenta,
- hypertenzia.



Pôrod

- Ukončenie tehotenstva, pri ktorom sa narodí živý novorodenec s hmotnosťou do 500g,
- ak 24h prežije novorodenec s menšou hmotnosťou,
- potrat,
- známky života.



Faktory ovplyvňujúce graviditu

- Narušená psychika ženy,
- nesprávna výživa matky,
- fajčenie,
- pitie alkoholu a čiernej kávy,
- lieky.



Medicínske komplikácie

- Prasknutie plodových obalov
- infekcie,
- dedičné alebo chromozómové poruchy,
- nádory alebo abnormálny tvar maternice.



Medicínske komplikácie

- Nedostatočná prenatálna starostlivosť,
- abrupcia (odlúčenie) placenty,
- vcestná placenta,
- abnormálne množstvo plodovej vody.



Novorodenec

- Klasifikuje sa podľa dvoch základných parametrov – dĺžky tehotenstva a pôrodnej hmotnosti.



Podľa dĺžky gestácie

- Predčasne narodené,
- narodené v termíne,
- prenášané.



Podľa hmotnosti

- Donosený novorodenec váži okolo 3200 gramov,
- deti pod 2500 sa považujú za nezrelé,
- novorodenci nad 4000 gramov.



Nezrelý novorodenec

- Dieťa, ktoré je narodené pred ukončeným 37. týždňom tehotenstva,
- nízka pôrodná hmotnosť,
- organizmus nezrelého dieťaťa je príliš krehký a zraniteľný.



2 kategórie novorodencov s nízkou hmotnosťou

- 1. Predčasne narodené (nedonosené) deti,**
- 2. Hypotrofickí novorodenci.**



Nedonosný novoroďenec

- Funkčná a anatomická nezrelosť,
- nízka hmotnosť,
 - 1000 až 1500 gramov
 - 1501 až 2000
 - 2001 až 2500 gramov
- nižšia dĺžka tela.



Hypotrofický novorodenec

- Nepomer medzi nízkou pôrodnou hmotnosťou a zväčša normálnou dĺžkou gravidity:
 - symetrický typ,
 - asymetrický typ.
- Líšia sa dychtivým pitím potravy.



Prvé dni

- Inkubátor:
 - udržiava telesnú teplotu,
 - vlhkosť vzduchu.
- Sonda → hadička zavedená do žalúdka.
- Obrovská starostlivosť sestier:
 - polohovanie dieťaťa
 - dôležitý dotyk teplých rúk.









„Klokankovanie“

- Po 2 mesiacoch,
- mamka je vyzlečená do pol pása,
- dieťaťko je iba v plienočke,
 - priložia ho mamke nahrudník,
- 30 minút.





17. november

- Celý svet si pripomína predčasne narodené deti.
- Tie, ktoré sú s nami, ale aj tie, ktoré boli príliš malinké a museli nás opustiť.
- Občianske združenie malíčok.





Zoznam použitej literatúry

- ČECH, E., HÁJEK, Z., MARŠÁL, K., SRP, B. a kol. 1999. *Porodnictví*. Vydání 1. Praha: GradaPublishing, spol. s r. o., 1999. 434 s. ISBN 80-7169-355-3.
- MARTIUS, G., BREEKWOLDT, M., PFLEIDERER, A. a kol. 1996. *Gynekologie a porodnictví*. 1. české vydání. Martin: Osveta, 1996. 648 s. ISBN 80-88824-56-7.
- KAPELEROVÁ, A. a kol. 2002. *Propedeutika detského lekára*. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave. 2002. 296 s. ISBN 80-223-1624-5.



Záver

Ďakujem za pozornosť.